

Vous êtes atteint de fibrose pulmonaire ou d'une autre maladie respiratoire chronique,

Etes-vous bien protégé contre les infections respiratoires ?

#### Pour vous et votre entourage

- Vaccination COVID

\*Actualisation 16 décembre 2022\*

Dose de rappel à 3 mois (si  $\geq 80$  ans ou immunodépression) ou à 6 mois de la précédente  
Délai minimal de 3 mois après l'infection  
(Quelques soient le nombre de doses réalisées auparavant)

Utilisation préférentielle des vaccins à ARN messagers bivalents (Spikevax® bivalent Original/Omicron BA.1, Comirnaty® bivalent Original/Omicron BA.1, Comirnaty® bivalent Original/Omicron BA.4-5), quel(s) que soi(en)t le(s) vaccin(s) utilisé(s) précédemment.

Utilisation possible du vaccin Nuvaxovid® (Novavax) ou du vaccin VidPrevtyn® Beta (Sanofi Pasteur et GSK) en rappel quand primo-vaccination par le vaccin Novavax, ou par un vaccin à ARN messenger (Comirnaty® ou Spikevax®) ou par un vaccin à vecteur adénoviral (Jcovden® Janssen ou Vaxzevria® AstraZeneca). Ces 2 nouveaux vaccins ne sont pas recommandés chez la femme enceinte.

- Vaccination grippe

$\geq 60$  ans : vaccin haute dose EFFLUELDA®

$< 60$  ans : vaccin dose standard

La réalisation concomitante des vaccins grippe et COVID-19 est possible. Les 2 injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur 2 sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras. Si non faits simultanément, il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations.

#### Pour vous

- Vaccination pneumocoque

Vaccin conjugué 13 valent (PREVENAR13®) suivi 2 mois plus tard du vaccin 23 valent (PNEUMOVAX®), revaccination possible vaccin 23 valent 5 ans plus tard



Société de Pneumologie de Langue Française